

ΤΜΗΜΑ Γ – Στοιχεία της αίτησης*:

(*προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ: τα παρακάτω δεδομένα δύναται να δημοσιοποιούνται, να συλλέγονται και να χρησιμοποιούνται με την συγκατάθεση των ως άνω χρηστών, σε κάθε περαιτέρω διαδικασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη του Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως κάθε φορά ισχύει.)

1. Αιτούμενο/α* Φυτοπροστατευτικό/α Προϊόν/όντα	α/α	Εμπορικό όνομα	Δραστική/ες ουσία/ες	ΑΑΔΑ (αν υφίσταται)	PPPAMS (αποδεικτικό)
	1.	VERTIMEC 1.8 EC	abamectin	14423/08-04-2013	PPP-2026-37551

2. Πεδίο εφαρμογής*:

Το καρπούζι και το πεπόνι είναι από τις σημαντικότερες καλλιέργειες σε πολλές περιοχές της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση στην παραγωγή πρώιμου καρπουζιού και την τέταρτη θέση στο σύνολο της παραγωγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο τετράνυχος (*Tetranychus urticae*) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εχθρούς της καρπουζιάς και πεπονιάς στις θερμές και ξηρές περιοχές της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι το VERTIMEC 1,8 EC είναι εγκεκριμένο στις καλλιέργειες του καρπουζιού και πεπονιού θερμοκηπίου στην ΕΕ και στην Ελλάδα καθώς και σε άλλες καλλιέργειες κηπευτικών θερμοκηπίου.

Η δραστική ουσία Abamectin ανήκει στην ομάδα των avermectins με ομάδα δράσης κατά IRAC 6 (MoA) που τη καθιστά μοναδική όσον αφορά τον τρόπο δράσης της, καθιστώντας την ένα εξαιρετικό εργαλείο διαχείρισης της ανθεκτικότητας αυτού του πολύ επιζήμιου εχθρού.

Από τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα συμβατικής και βιολογικής καταπολέμησης είναι το μοναδικό που κινείται διαλεσματικά (translaminar) καλύπτοντας φυτικές επιφάνειες, στις οποίες υπάρχει δυσκολία να έρθει σε επαφή με το ψεκαστικό διάλυμα. Μία πολύ σημαντική ιδιότητα ιδίως σε μεγαλύτερα στάδια ανάπτυξης των φυτών.

(*αναφέρεται και τυχόν συγκεκριμένο στάδιο της παραγωγής ή συγκεκριμένο σύστημα παραγωγής όπως βιολογική γεωργία, για το οποίο αιτείται η χρήση)

3. Στόχος:	<i>Tetranychus urticae</i>
------------	----------------------------

(*αναφέρεται και τυχόν συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης, για το οποίο αιτείται η χρήση)

4. Χρονικό διάστημα για το οποίο αιτείται η παρέκκλιση:	Έναρξη	Λήξη
	01/04/2026	29/07/2026
Αιτιολόγηση σε περίπτωση απρόβλεπτου κινδύνου*:		

5. Βασική αιτιολόγηση του κινδύνου*:

	Περιπτώσεις	Αιτιολόγηση
1)	Ανθεκτικότητα βάσει του τρόπου δράσης των ήδη εγκεκριμένων φ.π.	Για την καταπολέμηση του τετράνυχου όσον αφορά τα προϊόντα συμβατικής φυτοπροστασίας βάσει IRAC, υπάρχουν 2 διαφορετικοί τρόποι δράσης εκ των οποίων και οι δύο έχουν επιβεβαιωμένη ανεπτυγμένη ανθεκτικότητα, βάσει βιβλιογραφίας, στην καταπολέμηση του Τετράνυχου (<i>Tetranychus urticae</i>). Όσον αφορά τα βιο-φυτοπροστατευτικά, αυτά περιορίζονται σε φυσικές ουσίες από βοτανικά

ΕΝΤΥΠΟ 4 (αναθεώρηση 1)

	εκχυλίσματα και ορυκτά και δρουν αποτελεσματικά και ασφαλή σε συγκεκριμένα στάδια ανάπτυξης των καλλιεργειών. Το εντομοκτόνο σκεύασμα VERTIMEC 1,8 EC είναι εγκεκριμένο στην Ελλάδα με αριθμό έγκρισης 14423 / 08-04-2013 σε πολλές καλλιέργειες θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένου και αυτών του καρπουζιού και πεπονιού. Το σκεύασμα έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του στην καταπολέμηση διαφόρων ειδών ακάρεων και τετράνυχων σε ευρύ φάσμα καλλιεργειών, καθιστώντας το ένα αξιόπιστο εργαλείο φυτοπροστασίας για τους Έλληνες παραγωγούς. Λαμβάνοντας υπόψη και τα υπόλοιπα πλεονεκτήματα του σκευάσματος όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2, η ανάγκη για την κατά παρέκκλιση άδεια στο σκεύασμα VERTIMEC 1,8 EC για τον έλεγχο του πληθυσμού αυτού του εντόμου, για την μείωση της ζημιάς και παραγωγής, την υποβάθμιση της ποιότητας και εισοδήματος αλλά και υποβάθμιση της φήμης της Ελλάδας γι' αυτά τα εξαγώγιμα και σημαντικά προϊόντα, κρίνεται αναγκαία όσο ποτέ.
2) Η ανάγκη αντιμετώπισης οργανισμού στόχου σε διαφορετικό στάδιο ανάπτυξης από αυτό που δύνανται να καλύψουν τα εγκεκριμένα φ.π.	Όσον αφορά τα εγκεκριμένα συμβατικά προϊόντα φυτοπροστασίας αλλά και τα βιο-φυτοπροστατευτικά έχουν δράση σε συγκεκριμένα στάδια ανάπτυξης των ακάρεων, περιορίζοντας το παράθυρο εφαρμογής και την αποτελεσματικότητα. Και οι δύο αυτές κατηγορίες δρουν μόνο με επαφή και δευτερεύοντος με κατάποσή, οπότε και ο βαθμός αποτελεσματικότητας επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως, ο χρόνος εφαρμογής, που περιορίζεται σε στάδια πρόληψης, το στάδιο ανάπτυξης των φυτών, όπου σε πλήρη ανάπτυξη- κάλυψη υπάρχει υψηλή δυσκολία δράσης με επαφή και τέλος οι περιβαλλοντικές συνθήκες, όπου μπορεί πιθανόν να προκαλέσουν συμπτώματα φυτοτοξικότητας. Από τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα συμβατικής και βιολογικής καταπολέμησης είναι το μοναδικό που κινείται διαλεσματικά (translamīnar) καλύπτοντας φυτικές επιφάνειες , στις οποίες υπάρχει δυσκολία να έρθει σε επαφή με το ψεκαστικό διάλυμα. Μία πολύ σημαντική ιδιότητα ιδίως σε μεγαλύτερα στάδια ανάπτυξης των φυτών. Έχει δράση σε όλα τα κινητά στάδια (προνύμφες, νύμφες, ενήλικα)

ΕΝΤΥΠΟ 4 (αναθεώρηση 1)

6. Περιορισμός της αιτούμενης χρήσης*:

1. Στις Περιφερειακές Ενότητες:	α/α	Π.Ε.
	1	ΗΛΕΙΑΣ
	2	ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
	3	ΑΧΑΪΑΣ
	4	ΕΒΡΟΥ
	5	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
	6	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
	7	ΚΑΒΑΛΑΣ
	8	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
	9	ΛΑΚΩΝΙΑΣ
	10	ΛΑΡΙΣΑΣ
	11	ΛΑΣΙΘΙΟΥ
	12	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
	13	ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
	14	ΠΕΛΛΑΣ
	15	ΠΙΕΡΙΑΣ
	16	ΠΡΕΒΕΖΑΣ
	17	ΡΕΘΥΜΝΟΥ
	18	ΡΟΔΟΥ
	19	ΡΟΔΟΠΗΣ
	20	ΤΡΙΚΑΛΩΝ
	21	ΧΑΝΙΩΝ
	22	ΒΟΙΩΤΙΑΣ
	23	ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
	24	ΕΥΒΟΙΑΣ
	25	ΑΡΚΑΔΙΑΣ